

Verdejo



Ampelografía

Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Completamente abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación media-fuerte Densidad débil-media

Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Color nudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula o muy baja en el nudo Nula o muy baja en el entrenudo

Hoja joven:

Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales Media-fuerte

Densidad pelos tumbados Débil

Hoja adulta:

Tamaño del limbo Pequeño-medio

Forma del limbo Pentagonal

Número de lóbulos Cinco

Disposición lóbulos del seno peciolar Medio-poco abierto en lira

Hinchazón del haz Medio

Perfil en sección transversal Alabeado

Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores Profundidad superficial-media con lóbulos superpuestos

Pigmentación del haz Rojo hasta la primera bifurcación

Densidad pelos tumbados entre nervios principales Nula o muy baja

Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales Nula o muy baja

Longitud y densidad de pelos sobre el pecíolo Densidad nula o muy baja de pelos tumbados

Forma y longitud de dientes Dientes rectilíneos-convexos de longitud larga y con relación longitud-anchura grande



Verdejo



Racimo:

Tamaño Pequeño-mediano

Compacidad Compacto

Longitud pedúnculo Muy corto

Baya:

Tamaño Mediana

Uniformidad tamaño Uniforme

Color Epidermis Verde-amarilla

Forma de perfil Acuminada

Separación pedicelo Difícil

Grosor piel Fina

Pigmentación pulpa No coloreada

Consistencia pulpa Blanda

Suculencia pulpa Muy jugosa

Sabores particulares Ninguno

Formación pepitas Presentes

Sarmiento:

Color Marrón amarillento

Relieve superficie Estriado

Fenología:

Época de desborre: temprana-media

Época de maduración: temprana-media

Aptitudes agronómicas:

- Planta poco vigorosa, porte horizontal.
- Fertilidad baja. Producción media, racimos pequeños.
- Medianamente resistente a sequía, adaptada a terrenos poco fértiles, arcillosos. Precisa podas largas para obtener producciones aceptables.
- Muy sensible a oídio.

Potencial enológico:

- Vinos medianamente alcohólicos, de color amarillo verdoso con tonos acerados, muy aromáticos, en nariz destacan los aromas a almendra amarga, acidez entre media y alta, son vinos con cuerpo pero con cierta suavidad, el retrogusto es ligeramente amargo.
- Su vocación es ser empleado para la elaboración de vinos generosos al estilo de Jerez empleando la Palomino para mezclar. Actualmente se elaboran magníficos vinos jóvenes monovarietales o mezclados con Sauvignon o Macabeo en diferentes proporciones, últimamente se están elaborando vinos de Verdejo con fermentación o crianza en barricas de roble.

