

# ATRIA C.R.D.O.P. M-M

Consejo Regulador de la D. O. P. Montilla-Moriles

Aula de Viticultura

INFORMACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL VIÑEDO n° 10

ATRIA de VIÑA Campaña 2014			Para la semana 26 AL 31 de Mayo de 2014		
ENFERMEDADES	AVISO	PAGOS	PLAGAS	AVISO	PAGOS
<i>Mildiu</i>	Atentos a las lluvias /tratar antes		<i>Polilla racimo</i>	NO TRATAR	/ se avisara la 2ª g.
<i>Oidio</i>	TRATAR	TODOS	<i>Piral</i>		
<i>Podredumbres</i>			<i>Araña</i>		
<i>Yesca</i>			<i>Acariosis</i>		
<i>Excoriosis</i>			<i>Mosquito verde</i>		
<i>Eutypa</i>			<i>Erinosis</i>		
<b>FENOLOGIA PX</b>	De los días	19 al 25 de Mayo	Estado adelantado	<b>K</b>	Grano tamaño guisante
Estado predominante	<b>K</b>	Grano tamaño guisante	Estado atrasado	<b>J</b>	Cuajado

## Atención al oidio, tizne, ceniza, polvillo

### OIDIO

Las condiciones climáticas han provocado ataques de oidio en variedades sensibles, en rodales infectados de años anteriores o en parcelas no tratadas convenientemente.

Se aconseja recorrer el viñedo para observar el posible desarrollo del oidio en su parcela.

En las viñas con síntomas, realizar una pulverización empleando 500-600 litros de caldo por fanega (800-1000 l/Ha) mojando bien toda la vegetación (y los racimos mas escondidos)

Productos: AZOXISTROBIN ,BOSCALIDA + KRESOXIM METIL, CIPROCONAZOL, DIFENOCONAZOL, FENBUCONAZOL, FLUQUINCONAZOL, FLUSILAZOL, KRESOXIM METIL, MEPTILDINOCAP, PIRACLOSTROBIM, METRAFENONA, MYCLOBUTANIL, PENCONAZOL, PROQUINAZID, PROPICONAZOL, QUINOXIFEN, SPIROXAMINA, TEBUCONAZOL, TETRACONAZOL, TRIADIMENOL, TRIFLOXISTROBIN

En las parcelas, que por el marco de plantación, sea muy laborioso el tratar con pulverización , se empleara azufre-polvo con maquinas de espolvorear. Hay que guardar las precauciones habituales para no quemar las uvas.

### MILDIU

Estar atentos a las previsiones meteorológicas para tratar el mildiu antes de que llueva.

La lluvia del día 21/5 (8/20 l/m2) ha provocado contaminaciones secundarias. Se observaran nuevas manchas a primeros de junio (31/5 a 1-2-3/6) en más o menos intensidad dependiendo de los tratamientos realizados, la fecha de ejecución, el producto empleado y la cantidad de la lluvia caída.

**POLLILLA DEL RACIMO:** (gusano que pudre la uva) **Lobesia**. Esta plaga se encuentra en el inicio de vuelo de la 2ª generación, en los pagos más tempranos. En la mayoría de la zona, aun no hay capturas. Se avisara la necesidad o no de tratar y el momento en el conjunto del viñedo, solo en las parcelas más adelantadas y con presencia de glomérulos de 1ªg, se podría tratar con los productos: FENIXICARD<sup>(INSEGAR)</sup>=inicio de vuelo; INDOXACARB<sup>(STEWART)</sup>=entre inicio de vuelo e inicio de eclosión; METOXIFENOCIDE<sup>(INTREPID - RUNNER)</sup>= entre inicio de vuelo e inicio de eclosión.

Para cualquier consulta al técnico del Aula de Viticultura, comunicarlo al correo [consejo@montillamoriles.es](mailto:consejo@montillamoriles.es) .

E. FENOLOGICOS: A=Yema invierno; B=Inicio desborre; C = Punta verde; D = Salida hojas; E = Hojas extendidas; F = Racimos visibles; G = Racimos separados; H = Botones florales separados; I<sub>1</sub> = Inicio floración; I<sub>2</sub> = Plena floración; J = Cuajado; K = Grano tamaño guisante; L = Cerrado de racimos; M<sub>1</sub> = Inicio del envero; M<sub>2</sub> = Pleno envero; N = Maduración; O = Caída de hojas