

ATRIA C.R.D.O.P. M-M

Consejo Regulador de la D. O. P. Montilla-Moriles Aula de Viticultura
INFORMACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL VIÑEDO n° 10

ATRIA de VIÑA Campaña 2015			11 al 17 de mayo 2015		
ENFERMEDADES	AVISO	PAGOS	PLAGAS	AVISO	PAGOS
<i>Mildiu</i>	Tratar solo	si se prevén lluvias	<i>Polilla racimo</i>	Observar glomérulos en floración	
<i>Oidio</i>	TRATAR	TODOS (cuidado con las altas temperaturas)	<i>Piral</i>	+	Solo focos
<i>Podredumbres</i>			<i>Araña</i>	+	Solo focos
<i>Yesca</i>			<i>Acariosis</i>		
<i>Excoriosis</i>			<i>Mosquito verde</i>		
FENOLOGIA 2015	de los días	Desde 4 al 10 de mayo	Estado adelantado	I₂ J	Plena floración Cuajado
Estado predominante	I₁ I₂	Inicio y plena floración	Estado atrasado	H	Botones florales separados

Estar atentos a las previsiones METEOROLÓGICAS:

- PARA NO REALIZAR AZUFRADOS si las temperaturas previstas son muy ALTAS.
- Para tratar el mildiu solo si se prevén LLUVIAS.

MILDIUM.

Se han observado MANCHAS NUEVAS DE MILDIU, que se vieron en los días 6 de Mayo y posteriores, en bastantes parcelas de viñedo. Estas proceden de la contaminación que provocó la LUVIA del 26 de Abril.

Se recomienda tratar solo en el caso de que se prevean lluvias (en ese caso, pulverizar con un volumen de caldo suficiente, empleando un anti-mildiu penetrante o sistémico y con preferencia antes de la lluvia).

OIDIO.

En la mayoría de los viñedos se inicia la floración, aunque en las zonas más tempranas están en pleno cernido. Este es un momento apropiado para los espolvoreos de azufre, pero no debemos azufrar si en los 3 o 4 días posteriores se prevén ALTAS TEMPERATURAS, superiores a los 30°C.

Según los partes meteorológicos, a partir del jueves, bajara el termómetro.

ARAÑA AMARILLA: Si después de los tratamientos con azufre polvo contra el oidio no se controlan los focos de la araña, debe realizarse una pulverización con un acaricida específico: ACRINATRIN, ABAMECTINA(hasta floración), CLOFENTEZIN(ovicida), ETOXAZOL, FENPIROXIMATO, HEXITIAZOX, SPIRODICLOFEN. Cuando emplea acaricidas específicos, no tratar la parcela completa, sino solo tratar los rodales con síntomas.

PIRAL: (Gusanos que lían las hojas) No tratar ahora, solo se debe anotar el rodal atacado para tratarlo el año próximo.

POLILLA DEL RACIMO:(gusano que pudre la uva) Lobesia. Se recomienda observar los racimos en floración para contar los glomérulos por 100 racimos. Con este dato y otros, decidir el tratamiento de la 2ª Generación.

Despunte en viñedos formados en espaldera

El despunte en las espalderas debe realizarse lo más leve posible, siempre una o dos cuartas por encima del extremo de las postes intermedios. Solo los brotes laterales se pueden despuntar con más severidad para facilitar el paso de los equipos de tratamiento y el laboreo.

El objetivo es dejar el máximo de vegetación, ya que los expertos recomiendan 1 m² de hojas útiles por 1Kg/uva.

Los interesados en recibir el boletín de la ATRIA del Aula de Viticultura, solicitarlo consejo@montillamoriles.es

E. FENOLOGICOS: A=Yema invierno.....; C = Punta verde; D = Salida hojas; E = Hojas extendidas; F = Racimos visibles; G = Racimos separados; H = Botones florales separados; I₁ = Inicio floración; I₂ = Plena floración; J = Cuajado; ... O = Caída de hojas;