ATRIA C.R.D.O.P. M-M

Consejo Regulador de la D. O. P. Montilla-Moriles Aula de Viticultura

INFORMACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL VIÑEDO nº 11 hoja 1 de 2

ATRIA de VIÑA Campaña 2014	Para la semana 2 al 8 de Junio de 2014

ENFERMEDADES	AVISO	PAGOS	PLAGAS	AVISO	PAGOS
Mildiu	Solo tratar, si va a llover		*Polilla racimo*	Inicio del vuelo --	Presencia irregular
Oidio	TRATAR	TODOS	*Piral*		
Podredumbres			*Araña*	Solo tratar rodales con síntomas	
Yesca			*Acariosis*		
Excoriosis			*Mosquito verde*		
Eutypa			*Erinosis*		

FENOLOGIA PX	De los días	26 al 31 de Mayo	Estado adelantado	K	Grano tamaño guisante
Estado predominante	K	Grano tamaño guisante	Estado atrasado	J	Cuajado

Estado vegetativo: La fenología dominante es de Grano tamaño guisante, con relación a otras campañas el cultivo esta adelantado a lo que es habitual, con buen desarrollo y una vegetación vigorosa. El estado sanitario del viñedo es bueno, con la excepción de ciertas parcelas con ataques de oidio.

OIDIO

Se aconseja recorrer el viñedo para observar el posible desarrollo del oidio en su parcela.

Con estas temperaturas aun se puede aplicar azufre-polvo con maquinas de espolvorear, antes de la subida del termómetro, prevista para la semana próxima.

En las viñas con síntomas, realizar una pulverización empleando 500-600 litros de caldo por fanega (800-1000 l/Ha) mojando bien toda la vegetación (y los racimos mas escondidos) o menos volumen de caldo con las maquinas nebulizadoras que con las toberas dirigen el producto a los racimos.

Productos: AZOXISTROBIN ,BOSCALIDA + KRESOXIM METIL, CIPROCONAZOL, DIFENOCONAZOL, FENBUCONAZOL, FLUQUINCONAZOL, FLUSILAZOL, KRESOXIM METIL, MEPTILDINOCAP, PIRACLOSTROBIM, METRAFENONA, MYCLOBUTANIL, PENCONAZOL, PROQUINAZID, PROPICONAZOL, QUINOXIFEN, SPIROXAMINA, TEBUCONAZOL, TETRACONAZOL, TRIADIMENOL, TRIFLOXISTROBIN

El deshojado (solo viñas con mucho vigor) en la zona de los racimos y en el lado norte de la espaldera, ayuda al control del oidio por los siguientes motivos: 1.- Facilita que la pulverización llegue a los racimos más escondidos. 2.-Favorece la mejor aireación del interior de la cepa. 3.- Permite la entrada de luz ya que el oidio es vulnerable a la radiación ultravioleta.

MILDIU

Estar atentos a las informaciones meteorológicas y solo tratar si se prevén lluvias.

Aunque observe manchas nuevas de mildiu, no es necesario tratar, y solo haríamos la pulverización si se prevén lluvias, ya que estas manchas proceden del agua caída el día 21de mayo.

En el caso, poco probable, que se presente un rodal con munchas manchas, tratarlo de inmediato con

	Sistémicos	Penetrantes	Fijación a las ceras	Contacto
Acción erradicante (3) (desecamiento de manchas)	Iprovalicarb *(+Folpet)*, - benalaxil , benalaxil M, metalaxil y metalaxil M:	NO	NO	NO

(3) eliminación de los órganos contaminantes del hongo **(desecamiento de manchas).**

POLILLA DEL RACIMO: (gusano que pudre la uva) Lobesia **Hoja siguiente 2 de 2**

ARAÑA AMARILLA: Los rodales no controlados, con espolvoreo de azufre, se deben tratar con acaricidas específicos: clofentezin (ovicida), etoxazol, fenpiroximato, hexitiazos, spirodiclofen (excepto parrales de vid)

MOSQUITO VERDE: Observar las variedades más sensibles, que habitualmente son atacadas y plantaciones jóvenes de 1 año, 2, 3... Se detectan las primeras capturas del mosquito verde en las placas amarillas aunque es difícil verlo en las hojas. Se avisara de la evolución de la plaga. En algunos casos, se puede hacer coincidir el control de polilla y del mosquito empleando clorpirifos o Indoxacarb; otros productos de PI para el mosquito son Acrinatrin, Fenpiroximato.

Para cualquier consulta al técnico del Aula de Viticultura, comunicarlo al correo consejo@montillamoriles.es .

E. FENOLOGICOS: A=Yema invierno; B=Inicio desborre; C = Punta verde; D = Salida hojas; E = Hojas extendidas; F = Racimos visibles; G = Racimos separados; H = Botones florales separados; I_1 = Inicio floración; I_2 = Plena floración; J = Cuajado; K = Grano tamaño guisante; L = Cerrado de racimos; M_1 = Inicio del envero; M_2 = Pleno envero; N = Maduración; O = Caída de hojas

ATRIA de VIÑA Campaña 2014	Para la semana 2 al 8 de Junio de 2014

POLILLA DEL RACIMO: (gusano que pudre la uva) Lobesia. Este insecto tiene tres generaciones. La plaga se encuentra en el inicio de vuelo de la 2ª generación. El control se puede realizar en pulverización tanto en la 2ªg. como en la 3ªg., pero si se hace en espolvoreo es más aconsejable en esta 2ªg. ya que en la 3ªg. estaría próximo a vendimia.

Parcelas que deben ser tratadas: Al tener una distribución muy irregular, TRATAR SOLO las parcelas donde se observen: Rodales donde habitualmente se pudra la uva y que durante el despampano observáramos gusanos en los racimos en el momento de la floración.

1ª gen Floración Glomérulo

1ª generación Oruga pleno desarrollo

2ª generación Mariposa

2ª generación huevo

2ª generación Larva de 1 mm



2ª generación Daño en la uva

Tratamiento con productos en pulverización:

Materias Activas // Nombre–Casa Comercial // Momento aplicación Pagos de viñedo tempranos o tardíos

Fenoxicarb	Insegar-Syngenta; Yoruba, Sarabia	**Inicio vuelo**	**Momento en viña tempranas y tardías**
Metoxifenocide	Runner-Bayer; Intrepid	**Entre inicio de vuelo e inicio eclosión**	**Momento viña tempranas**
Indoxacarb	Steward.-Du Pont.	**Entre inicio de vuelo e inicio eclosión**	**Momento viña tempranas**
Clorantraniliprol	Coragen.-DuPont	**Entre inicio de puesta e inicio eclosión**	**No es el momento**
Bacillus thuriengiensis	Varios – Varias	**Inicio eclosión huevos**	**No es el momento**
Emamectina	Affirm.-Syngenta Agro.S.A	**Inicio eclosión huevos**	**No es el momento**
Spinosad	Spintor 480 SC-Dow AgroSciences	**Inicio eclosión huevos**	**No es el momento**
Tebufenocide	Mimic-Dow AgroSciences	**Inicio eclosión huevos**	**No es el momento**

Tratamiento con productos en espolvoreo o pulverización:

Clorpirifos	Varios - Varias	**Máxima eclosión de huevos-ORUGAS**	**No es el momento**
Metil clorpirifos	Reldan E-Dow AgroSciences	**En vegetación-ORUGAS**.	**No es el momento**

Productos en espolvoreo (a los racimos): el momento será más adelante y se avisara, los productos en espolvoreo hay que aplicarlos con las orugas, ya que su persistencia es menor que los que se aplican en pulverización pero en las viñas en cabeza el polvo entra mejor en los racimos.En los avisos siguientes se concretara las fechas de empleo para cada producto y la intensidad del ataque. consejo@montillamoriles.es .