ATRIA C.R.D.O.P. M-M

Consejo Regulador de la D. O. P. Montilla-Moriles Aula de Viticultura

INFORMACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL VIÑEDO nº 12

ATRIA de VIÑA Campaña 2015	25 al 31 de mayo 2015

ENFERMEDADES	AVISO	PAGOS	PLAGAS	AVISO	PAGOS
Mildiu	Tratar solo	si se prevén lluvias	*Polilla racimo*		
Oidio	TRATAR	TODOS	*Piral*		
Podredumbres			*Araña*	Tratar	Solo focos
Yesca			*Acariosis*		
Excoriosis			*Mosquito verde*		

FENOLOGIA 2015	de los días	Desde 18 al 24 de mayo	Estado adelantado	K	Grano tamaño guisante
Estado predominante	J	Cuajado	Estado atrasado	I_2	Plena floración

AVISO: se recomienda recorrer el viñedo con el objeto de observar la presencia o no de síntomas de ataques de araña y los posibles primeros focos de oidio.

MILDIUM.
La lluvia caída en la tarde del día 24 (1-4 l/ m^2) no es suficiente para que las manchas de mildiu críen pelusa y por tanto no hay nueva contaminación. Hay que analizar dos circunstancias, en primer lugar la presencia de manchas, aunque escasas, repartidas por toda la zona y en segundo término la inestabilidad del tiempo, propio de la primavera, hasta mediados de junio. Podemos adoptar una de estas tres medidas:
Medida prudente: Tratar para tener el viñedo protegido hasta primeros de junio, con productos de contacto, penetrantes o sistémicos.
Medida normal: Tratar antes de la lluvia, solo en el caso de que se prevean lluvias, con productos penetrantes o sistémicos.
Medida arriesgada: Tratar inmediatamente después de una lluvia contaminante (lluvias de 7 l/ m^2 a 10 l/ m^2), con productos con Acción de parada (Stop) que pueden detener el desarrollo del hongo después de que este ha penetrado en la planta y aun no presenta síntomas visibles (productos en el boletín nº 8).

OIDIO: El viñedo esta en el periodo más sensible al oidio de la vid. Este es desde floración a cerramiento de racimos (racimos apretados) o de inicio de floración a inicio de envero.
Azufre en espolvoreo: En el caso de realizar azufrados a finales de mayo, con uvas con cierto tamaño y la tendencia natural a subir la temperaturas, hay que emplear unas dosis moderadas de azufre y solo tratar con maquinas de espolvoreo.
Pulverización con antiodio: En parcelas que suelen presentar ataques de oidio, o en viñedos de variedades sensibles, o cuando las vides están formadas en espaldera, se recomienda una tratamiento con las uvas tamaño guisante y otro antes de que se aprieten los racimos.

ARAÑA AMARILLA: En los tratamientos en pulverización contra la araña es imprescindible mojar bien el envés de las hojas, en otro caso los resultados pueden ser poco eficaces.
Si después de los tratamientos con azufre polvo contra el oidio no se controlan los focos de la araña, debe realizarse una pulverización con un acaricida especifico: ACRINATRIN, ABAMECTINA, CLOFENTEZIN, ETOXAZOL, FENPIROXIMATO, HEXITIAZOX, SPIRODICLOFEN.

POLILLA DEL RACIMO:(gusano que pudre la uva) Lobesia. Se avisara para decidir el tratamiento de la 2ªGeneracion.

Los interesados en recibir el boletín de la ATRIA del Aula de Viticultura, solicitarlo consejo@montillamoriles.es

E. FENOLOGICOS: A=Yema invierno; B=Inicio desborre ;(B_1 lloro B_2 yema hinchada) ; C = Punta verde; D = Salida hojas; E = Hojas extendidas; F = Racimos visibles; G = Racimos separados; H = Botones florales separados; I_1 = Inicio floración; I_2 = Plena floración; J = Cuajado; K = Grano tamaño guisante; L = Cerrado de racimos; M_1 = Inicio del envero; M_2 = Pleno envero; N = Maduración; O = Caída de hojas;