ATRIA C.R.D.O.P. M-M

Consejo Regulador de la D. O. P. Montilla-Moriles Aula de Viticultura

INFORMACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL VIÑEDO nº 13

ATRIA de VIÑA Campaña 2014			Para la semana 16 al 21 de Junio de 2014		
ENFERMEDADES	AVISO	PAGOS	**PLAGAS**	AVISO	PAGOS
Mildiu			*Polilla racimo*	Final del Vuelo --	Presencia irregular
Oidio	TRATAR	Viñas con síntomas	*Araña*	Solo tratar rodales con síntomas	
Podredumbres			*Acariosis*		
Yesca	Primeros síntomas /cepas aisladas		*Mosquito verde*	1º adultos	

FENOLOGIA PX	De los días	8 al 14 de Mayo	Estado adelantado	**L**	Cerrado racimos
Estado predominante	**K L**	Grano guisante Cerrado racimos	Estado atrasado	**K**	Grano tamaño guisante

Estado vegetativo: el viñedo se encuentra con un buen desarrollo en la vegetación y las uvas tienen un tamaño apropiado. Se observan racimos con un numero bajo de uvas "racimos claros". En la última quincena, las dos semanas de adelanta va disminuyen, por lo que a estas fechas tendremos sobre 7 a 10 días de adelanto a lo habitual en la fenología.

YESCA: (hinojorey, honguillo, rápido) Comienzan a observarse las primeras cepas con síntomas, en estos casos debemos abrir una herida en la cabeza de la cepa para airear el interior de la cepa paralizando el desarrollo del hongo.

Uvas muy arrugadas de color marron: para este tecnico, las causas de que se esten secando algunas uvas dentro del racimo son dificiles de determinar. Se podrian achacar a golpes con los aperos, o de la enfermedad fisiologica desecamiento del raquis (mate o raspon), o de mildiu larvado procedente de la lluvia del 21/5, o quemado de azufre

OIDIO: Se aconseja recorrer el viñedo para observar el posible desarrollo del oidio en su parcela.

En las viñas con síntomas, realizar una pulverización empleando 500-600 litros de caldo por fanega (800-1000 l/Ha) mojando bien toda la vegetación (y los racimos mas escondidos) o menos volumen de caldo con las maquinas nebulizadoras que con las toberas dirigen el producto a los racimos.

Productos: AZOXISTROBIN ,BOSCALIDA + KRESOXIM METIL, CIPROCONAZOL, DIFENOCONAZOL, FENBUCONAZOL, FLUQUINCONAZOL, FLUSILAZOL, KRESOXIM METIL, MEPTILDINOCAP, PIRACLOSTROBIM, METRAFENONA, MYCLOBUTANIL, PENCONAZOL, PROQUINAZID, PROPICONAZOL, QUINOXIFEN, SPIROXAMINA, TEBUCONAZOL, TETRACONAZOL, TRIADIMENOL, TRIFLOXISTROBIN

El deshojado (solo viñas con mucho vigor) en la zona de los racimos y en el lado norte de la espaldera, ayuda al control del oidio por los siguientes motivos: 1.- Facilita que la pulverización llegue a los racimos más escondidos. 2.-Favorece la mejor aireación del interior de la cepa. 3.- Permite la entrada de luz ya que el oidio es vulnerable a la radiación ultravioleta.

POLILLA DEL RACIMO: (gusano que pudre la uva) Lobesia. Este insecto tiene tres generaciones. La plaga se encuentra en pleno – FINAL VUELO de la 2ª generación (final de la curva de vuelo). El control se puede realizar en pulverización tanto en la 2ªg. como en la 3ªg., pero si se hace en espolvoreo es más aconsejable en esta 2ªg. ya que en la 3ªg. estaría próximo a vendimia.

Parcelas que deben ser tratadas: Al tener una distribución muy irregular, TRATAR SOLO las parcelas donde se observen: Rodales donde habitualmente se pudra la uva y que durante el despampano observáramos gusanos en los racimos en el momento de la floración.

Tratamiento con productos en pulverización:

Bacillus thuriengiensis = Varios – Varias	######	Spinosad = Spintor 480 SC-Dow AgroSciences	##### características	**Inicio eclosión huevos Momento viñas muy tardias**
Emamectina = Affirm.-Syngenta Agro.S.A	#####	Tebufenocide = Mimic-Dow AgroSciences	##### características	**Inicio eclosión huevos Momento viñas muy tardias**

Tratamiento con productos en espolvoreo o pulverización:

Clorpirifos =Varios-Varias	**Máxima eclosión de huevos-ORUGAS**	**Pulverización es el momento y 25-30 en polvo**
Metil clorpirifos=Reldan E-Dow AgroSciences	**-ORUGAS**	**Pulverización es el momento y 25-30 en polvo**

Productos en espolvoreo (a los racimos): el momento será la última semana de junio, los productos en espolvoreo hay que aplicarlos con las orugas, ya que su persistencia es menor que los que se aplican en pulverización pero en las viñas en cabeza el polvo entra mejor en los racimos. consejo@montillamoriles.es .

E. FENOLOGICOS: A=; J = Cuajado; K = Grano tamaño guisante; L = Cerrado de racimos; M_1 = Inicio del envero