

ATRIA C.R.D.O.P. M-M

Consejo Regulador de la D. O. P. Montilla-Moriles Aula de Viticultura
INFORMACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL VIÑEDO nº 13 (30/5)

ATRIA de VIÑA Campaña 2016	Para 30 Mayo al 6 junio 2016
----------------------------	------------------------------

ENFERMEDADES	AVISO	PAGOS	PLAGAS	AVISO	PAGOS
Mildiu	TRATAR	TODOS	Polilla racimo	Observar orugas en los racimos	
Oidio	TRATAR		Araña	Observar focos	
FENOLOGIA 2016	de los días	desde 23 al 29 de Mayo	Estado adelantado	J	Cuajado
Estado predominante	I₂	Plena floración	Estado atrasado	H	Botones Florales separados

MILDIU

LA VIÑA ESTA EN UN MOMENTO MUY SENSIBLE →

**FLORACIÓN
- CUAJADO**

**El ataque de Mildiu tiene una distribución muy irregular, dependiendo de:
Los tratamientos realizados y Las manchas existentes.**

Las lluvias del Sábado 28/05 pueden haber causado nuevas contaminaciones de Mildiu. El nivel del ataque está en función de la lluvia caída, 4-12 l/m², de las manchas existentes en la parcela, y del producto empleado en los últimos 5 o 7 días.

Debido a la diversidad de condiciones y características del viñedo, es difícil aconsejar de forma generalizada **TRATAR** o **NO TRATAR**.

Para decidir correctamente, recorrer el viñedo en busca de manchas de mildiu y observar si han fructificado, tiene pelusa.

SE RECOMIENDA:

- Parcelas Sin Manchas. Solo tratar antes de que llueva.
- Parcelas Con Manchas, sin pelusa. Solo tratar antes de que llueva.
- Parcelas Con Manchas, con pelusa.
 - Tratadas antes de la última semana → **TRATAR INMEDIATAMENTE** con productos erradicantes.
 - Tratadas en los últimos 5-6 días, con productos sistémicos → Volver a tratar con productos erradicantes a los 8-10 días del tratamiento anterior.

OIDIO:

Comienzan a observarse los primeros síntomas de esta enfermedad.

Las parcelas que aún no se han tratado, debemos realizar espolvoreo con Azufre en los próximos 10 días, antes de que la uva sea de tamaño garbanzo y suban las temperaturas, en este caso podrían provocar quemaduras.

Se aconseja: Tratar con sistémicos mezclados con las aplicaciones de mildiu. Y/O emplear azufre en polvo al mejorar el tiempo después de realizar la aplicación contra el mildiu.

POLILLA DEL RACIMO:

En la floración es el momento óptimo de observar la presencia de orugas en el racimo. Esta información, junto con lo que se aporta en el Boletín, es muy útil para decidir, en fechas posteriores, la necesidad de realizar tratamientos en la 2ª y 3ª generación.

PIRAL: (gusanos que lían las hojas) **NO TRATAR**

La oruga de Piral (cabeza negra) es distinta a la polilla del racimo (cabeza rubia).