

ATRIA C.R.D.O.P. M-M

Consejo Regulador de la D. O. P. Montilla-Moriles Aula de Viticultura
INFORMACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL VIÑEDO n° 14

ATRIA de VIÑA Campaña 2015			8 al 14 de Junio de 2015		
ENFERMEDADES	AVISO	PAGOS	PLAGAS	AVISO	PAGOS
<i>Mildiu</i>	Tratar solo	si se prevén lluvias	<i>Polilla racimo</i>	Poca presencia // inicio-pleno vuelo	
<i>Oidio</i>	TRATAR	TODOS	<i>Piral</i>		
<i>Podredumbres</i>			<i>Araña</i>	Ataques muy extendidos//Tratar solo focos	
<i>Yesca</i>			<i>Acariosis</i>		
<i>Excoriosis</i>			<i>Mosquito verde</i>	Primeros insectos en viñas frondosas	
FENOLOGIA 2015	de los días	Desde 1al 7 de mayo	Estado adelantado	K	Grano tamaño guisante
Estado predominante	K	Grano tamaño guisante	Estado atrasado	K	Grano tamaño guisante

Atención:

Vigilar los focos de araña

Se recomienda recorrer el viñedo con el objeto de observar la presencia de síntomas de ataques de araña, cepas afectadas de yesca y de posibles focos de oidio.

ARAÑA AMARILLA:

Vigilar periódicamente los focos de araña, con una periodicidad semanal, aunque creamos tenerlos controlados. Hay una fuerte presencia de la araña amarilla en los viñedos, muchísimo más alta de lo habitual. En los tratamientos de pulverización contra la araña es imprescindible mojar bien el envés de las hojas, en caso contrario los resultados pueden ser poco eficaces. Si después de los tratamientos con azufre polvo contra el oidio no se controlan los focos de la araña, debe realizarse una pulverización con un acaricida específico.

YESCA: apoplejía (Hinojorey, Honguillo, Rápido) Comienzan a observarse las primeras cepas con síntomas, en estos casos debemos abrir una herida en la cabeza de la cepa para airear el interior de la cepa paralizando el desarrollo del hongo.

OIDIO: Hasta el cerramiento de los racimos (racimos apretados) el viñedo es muy sensible a los ataques de oidio. Recorrer detenidamente la parcela, si observa algún síntoma debe realizar el tratamiento.

ARAÑA AMARILLA



YESCA



YESCA



MILDIUM: SOLO Tratar en el caso de que se prevean lluvias. En el caso de lluvia de más 7/10 mm., tratar inmediatamente, con productos con Acción de parada (Stop) que pueden detener el desarrollo del hongo después de que este ha penetrado en la planta y aun no presenta síntomas visibles. Productos en el aviso n° 8.

POLILLA DEL RACIMO:(gusano que pudre la uva) Comienzo de vuelo de las mariposas de la 2ªG. Poca presencia de plaga en esta campaña y en esta generación. En el caso de suficiente presencia de plaga, se avisara.

Los interesados en recibir el boletín de la ATRIA del Aula de Viticultura, solicitarlo consejo@montillamoriles.es

E. FENOLOGICOS:A..... I₂ = Plena floración; J = Cuajado; K = Grano tamaño guisante; L = Cerrado de racimos; M₁ = Inicio del envero; M₂ = Pleno envero; N = Maduración; O = Caída de hojas;