

ATRIA C.R.D.O.P. M-M

Consejo Regulador de la D. O. P. Montilla-Moriles

Aula de Viticultura

INFORMACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL VIÑEDO n° 14 (07/06)

ATRIA de VIÑA Campaña 2016	Para 6 al 13 junio 2016
----------------------------	-------------------------

ENFERMEDADES	AVISO	PAGOS	PLAGAS	AVISO	PAGOS
Mildiu	NO TRATAR	TODOS	Polilla racimo	Se avisara	
Oidio	TRATAR		Araña	Observar focos	
FENOLOGIA 2016	de los días	desde 1 al 6 junio	Estado adelantado	J -K	Cuajado-Uva tamaño guisante
Estado predominante	I₂ - J	Plena floración - Cuajado	Estado atrasado	H- I₂	Botones Florales separados - Floración

AZUFRE EN POLVO en el viñedo: Época de aplicación y beneficios de su uso.

Época de aplicación: Desde 20-30 cm de longitud del pampano hasta el final de la floración (cernido).

¡CUIDADO! altas temperaturas

- Cuando la uva tiene tamaño guisante o garbanzo, y suben las temperaturas podemos “quemar” el fruto.
- Antes de “azufrear” debemos consultar las previsiones meteorológicas, y evitar el espolvoreo si están previstas lluvias o altas temperaturas.

Beneficios:

OIDIO	ARAÑA	ACARIOSIS	ERINOSIS
Controla	Frena	Frena	Frena
En espalderas completar con Sistémicos.	En poblaciones bajas lo controla.	En poblaciones bajas lo controla.	Controla



Fot.1. Hoja con acariosis.



Fot.2. Brote con acariosis y brote sano.



Fot.3. Brote con acarisis.

OIDIO: TRATAR. En espalderas con ataques de oidio: 1º Pulverizar con sistémicos
2º Espolvorear con azufre cuando bajen las temperaturas.

MILDIU: Con temperaturas superiores a 30°C → Impiden la germinación de las esporas.

(NO TRATAR) Con temperaturas superiores a 35°C → Impiden el desarrollo del hongo.

Solo en parcelas NO Tratadas y que además tenían presencia de manchas que fructificaron (pelusa) con las lluvias del 28 Mayo, es probable que puedan aparecer nuevas manchas el 6-7-8 junio.

POLILLA DEL RACIMO La 1ª generación ha tenido poca presencia. Comienza el vuelo de la 2ª gen, se avisará evolución.

ARAÑA Si se observa en los rodales afectados la presencia araña en las hojas nuevas, se aconseja tratar mojando bien por el envés de la hoja.

Enfermedades de madera: Se está realizando muestreos de cepas con síntomas, en colaboración con la Escuela de Agrónomos y Montes, de la Universidad de Córdoba, el Departamento de Agronomía Área de Producción Vegetal. Si observa anomalías en brotación o brazos con poco desarrollo, puede consultar en consejo@montillamoriles.es, si es posible enviar foto, o llame a los siguientes teléfonos: 957652110, 680216567.

F : A=Yema .. F = Racimos visibles; G = Racimos separados; H = Botones florales separados; I₁ = Inicio floración; I₂ = Plena floración; J = Cuajado; ...