ATRIA C.R.D.O.P. M-M

Consejo Regulador de la D. O. P. Montilla-Moriles Aula de Viticultura

INFORMACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL VIÑEDO nº 15

ATRIA de VIÑA Campaña 2015	22 al 28 de Junio de 2015

ENFERMEDADES	AVISO	PAGOS	PLAGAS	AVISO	PAGOS
Mildiu			*Polilla racimo*	No Tratar	nivel bajo de ataque
Oidio	TRATAR	Viñas con síntomas	*Piral*		
Podredumbres			*Araña*	Solo tratar rodales con arañas vivas	
Yesca	Síntomas en cepas aisladas		*Acariosis*		
Excoriosis			*Mosquito verde*	Primeros insectos en viñas frondosas	

FENOLOGIA 2015	de los días	Desde 15 al 21 dejunio	Estado adelantado	L	Cerrado de racimos
Estado predominante	K	Grano tamaño guisante	Estado atrasado	K	Grano tamaño guisante

Atención:
Vigilar rodales con oidio en los racimos

Se recomienda recorrer el viñedo con el objeto de observar la presencia de síntomas de oidio, ataques de araña y cepas afectadas de yesca.
Los tratamientos, que se realicen en estas fechas, deben ir precedidos por una observación del cultivo para determinar la presencia de la plaga o enfermedad objeto del control.

OIDIO: (ceniza, gangrena, tizne): En esta última semana se ha observado un recrudecimiento de los ataques de oidio en el racimo y en otras partes verdes de la planta. En parcelas con síntomas, realizar tratamientos:
Si realiza ESPOLVOREO con azufre, se recomienda, si es posible, el azufre mezclarlo con polvo de cal, para evitar quemaduras.
Si realiza PULVERIZACIÓN, debe emplear un volumen de caldo suficiente (500-600 litros/fanega ó 800-1000 l/Ha) para mojar bien toda la vegetación y en especial los racimos (y con más interés los escondidos).
Productos: Productos: AZOXISTROBIN ,BOSCALIDA + KRESOXIM METIL, CIPROCONAZOL, FENBUCONAZOL, FLUQUINCONAZOL, FLUSILAZOL, KRESOXIM METIL, MEPTILDINOCAP, PIRACLOSTROBIM, METRAFENONA, MYCLOBUTANIL, PENCONAZOL, PROQUINAZID, QUINOXIFEN, SPIROXAMINA, TEBUCONAZOL, TETRACONAZOL, TRIADIMENOL, TRIFLOXISTROBIN

Estrategias contra el oidio de algunas casas comerciales en rodales con cierta presión de la enfermedad

//BASF: COLLIS+azufre mojable. //BAYER CROPSCI: LUNA experience. //DOW AGROSC: KARATHANE STAR . //SYNGENTA: DYNALI+azufre m.

ARAÑA AMARILLA:
Vigilar periódicamente los focos de araña, semanalmente, aunque creamos tenerlos controlados.
En los tratamientos de pulverización contra la araña es imprescindible mojar bien el envés de las hojas, en caso contrario los resultados pueden ser poco eficaces.
Productos: abamestina, clofentezin (ovicida), etoxazol, fenpiroximato, hexitiazos, piridaben, spirodiclofen.

YESCA: apoplejía (Hinojorey, Honguillo, Rápido) Comienzan a observarse las primeras cepas con síntomas. En estos casos debemos abrir una herida en la cabeza de la cepa, para airear su interior, paralizando al hongo.

MOSQUITO VERDE: Observar la vegetación para determinar la presencia o no de la plaga en su viñedo. Tratar solo si hay presencia, principalmente en las variedades sensibles (tempranillo, …), parcelas que habitualmente son atacadas y plantaciones jóvenes de 1 año, 2, 3... Productos en PI: Acrinatrin, clorpirifos, Fenpiroximato, Indoxacarb.

POLILLA DEL RACIMO:(gusano que pudre la uva) Poca presencia de plaga en esta campaña y en esta generación. En el caso de que en la tercera generación tengamos umbral de tratamiento, se avisara.

Los interesados en recibir el boletín de la ATRIA del Aula de Viticultura, solicitarlo consejo@montillamoriles.es

E. FENOLOGICOS:A……. I_2 = Plena floración; J = Cuajado; K = Grano tamaño guisante; L = Cerrado de racimos; M_1 = Inicio del envero; M_2 = Pleno envero; N = Maduración; O = Caída de hojas;