

# ATRIA C.R.D.O.P. M-M

Consejo Regulador de la D. O. P. Montilla-Moriles

Aula de Viticultura

INFORMACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL VIÑEDO nº 6

ATRIA de VIÑA Campaña 2014			Para la semana 28-Abril al 4-Mayo de 2014		
ENFERMEDADES	AVISO	PAGOS	PLAGAS	AVISO	PAGOS
Mildiu	TRATAR	TODOS	Polilla racimo		
Oidio	TRATAR	TODOS	Piral	+	
Podredumbres			Araña		
Yesca			Acariosis		
Excoriosis			Mosquito verde		
Eutypa			Oruga peluda		
			Erinosis		

  

FENOLOGIA PX	De los días	21 al 27 de Abril	Estado adelantado	H	Botones florales separados;
Estado predominante	G	Racimos separados;	Estado atrasado	FG	R. visibles y R. separados;

## MILDIU:

Estado actual del desarrollo del hongo es el siguiente: las lluvias del 20-21 de abril (40 mm) han provocado contaminaciones primarias, aunque estas suelen ser escasísimas, se están desarrollando dentro de las hojas y demás partes verdes de la cepa. Detectar estas primeras manchas es primordial para determinar la estrategia en los tratamientos. Para lo cual se convoca el **Concurso MILDIU**

### **Premios FUNDACIÓN CAJA RURAL DE CORDOBA “Pedro Cabezuelo”**

Como recomendación general, se aconseja para el control del Mildiu el estar alerta a las previsiones meteorológicas para tratar antes de que llueva. Aplicar productos penetrantes o sistémicos (para que no se laven con los chubascos) lo más cercano posible a los días de lluvia, pero no nos debemos arriesgar a realizar la aplicación con posterioridad.

Las viñas que en los días de lluvia de 1-2-3 de abril tenían un desarrollo de más 10 cm, deben estar tratadas. En una de estas parcelas (Montemayor) se detectó la primera mancha. (aviso del 24/4/14)

En cualquier caso, las viñas deben estar protegidas antes de floración para evitar ataques de mildiu en este periodo tan sensible a la enfermedad.

**OIDIO: (ceniza, gangrena, tizne)** TRATAR. Al ser esta una enfermedad endémica, todos los años ataca con más o menos intensidad. Tratamiento temprano con el viñedo con pámpanos de entre 20 – 30 cm. es **imprescindible** en las **parcelas** que el año anterior presentaron **focos** de esta enfermedad **no** totalmente **controlados**.

Productos: AZUFRE, AZOXISTROBIN, BOSCALIDA + KRESOXIM METIL, CIPROCONAZOL, DIFENOCONAZOL, FENBUCONAZOL, FLUQUINCONAZOL, FLUSILAZOL, KRESOXIM METIL, MEPTILDINOCAP, PIRACLOSTROBIM, METRAFENONA, MYCLOBUTANIL, PENCONAZOL, PROQUINAZID, PROPICONAZOL, QUINOXIFEN, SPIROXAMINA, TEBUCONAZOL, TETRACONAZOL, TRIADIMENOL, TRIFLOXISTROBIN,

El azufre en polvo, aplicado con la tallea o con la máquina de espolvorear, es una de las mejores soluciones contra el oidio.

**ARAÑA AMARILLA:** Si hay presencia de síntomas tratar con azufre polvo contra el oidio y seguir la evolución de la plaga. Si a pesar de los azufrados no se controla debe realizarse una pulverización con un acaricida específico: ACRINATRIN, ABAMECTINA (hasta floración), CLOFENTEZIN (ovicida), ETOXAZOL, FENPIROXIMATO, HEXITIAZOX, PIRIDABEN (solo araña roja), SPIRODICLOFEN. Cuando emplea acaricidas específicos, no tratar la parcela completa, sino solo los rodales con síntomas.

**ENFERMEDADES DE MADERA,** síntomas en las CEPAS: BROTACION RAQUITICA, BRAZOS SECOS, PLANTAS DE 3-5 AÑOS SECAS EN LA BROTACION: puede ser producido por varias causas como hongos de madera, hongos de la podredumbre de raíz, portainjertos que se secan, soldadura del injerto,... Sanidad Vegetal de la Junta de Andalucía, realiza una prospección para estudiar los distintos patógenos. Para cualquier consulta llame al técnico del Aula de Viticultura, solo tienen que comunicarlo al correo [consejo@montillamoriles.es](mailto:consejo@montillamoriles.es).

E. FENOLOGICOS: A=Yema invierno; B=Inicio desborre; C = Punta verde; D = Salida hojas; E = Hojas extendidas; F = Racimos visibles; G = Racimos separados; H = Botones florales separados; I<sub>1</sub> = Inicio floración; I<sub>2</sub> = Plena floración; J = Cuajado; K = Grano tamaño guisante; L = Cerrado de racimos; M<sub>1</sub> = Inicio del envero; M<sub>2</sub> = Pleno envero; N = Maduración; O = Caída de hojas