

ATRIA C.R.D.O.P. M-M

Consejo Regulador de la D. O. P. Montilla-Moriles

Aula de Viticultura

INFORMACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL VIÑEDO n° 8

ATRIA de VIÑA Campaña 2015	27 al 30 de Abril 2015
----------------------------	------------------------

ENFERMEDADES	AVISO	PAGOS	PLAGAS	AVISO	PAGOS
<i>Mildiu</i>	TRATAR	TODOS	<i>Polilla racimo</i>		
<i>Oidio</i>	TRATAR	TODOS	<i>Piral</i>	+	Solo focos
<i>Podredumbres</i>			<i>Araña</i>	+	Solo focos
<i>Yesca</i>			<i>Acariosis</i>		
<i>Excoriosis</i>			<i>Mosquito verde</i>		


FENOLOGIA 2015	de los días	Desde 20 al 26 de abril	Estado adelantado	G H	Racimos Y Botones florales separados
Estado predominante	G	Racimos separados	Estado atrasado	F	Racimos visibles



Mancha de mildiu detectada en la mañana del 24/abril/2015 en En Aguilar de la Frontera foto de José Antonio Pérez.



//Brotación irregular en los brazos de // espaldera con vigor. Foto Ángela Portero.



Falsa escoriosis, no tratar. Son las llamadas yemas "culo almirez" Foto David Osuna.

MILDIU:

Han aparecido las primeras manchas de mildiu el viernes día 24/4/2015. La lluvia generalizada por toda la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles, ha provocado infección de mildiu.

Las manchas procedentes de esta lluvia serán visibles entre el 7 ó 10 de mayo, dependiendo de las temperaturas.

Tratar inmediatamente

Aplicar productos penetrantes o sistémicos (para que no se laven con los chubascos) con acción parada (Stop) en el caso de realizar la aplicación con posterioridad a la lluvia del 26.

En cualquier caso, las viñas deben estar protegidas antes de floración para evitar ataques de mildiu en este periodo tan sensible a la enfermedad.

ALGUNOS Productos contra el mildiu mas aconsejables DESPUÉS de la lluvia. Características:

	Sistémicos	Penetrantes	Fijación a las ceras	Contacto
Acción de parada (Stop) (2)	fosetil-Al:2 días iprovalicarb F:3 días benalaxil , benalaxil M, metalaxil y metalaxil M:4 días	2 días azoxistrobín, bentiavalicarb, cimoxanil, dimetomorf, piraclostrobín	NO (excepto los siguientes: ciazofamida - que tiene 2 días ; valifenalato)	NO

(2) pueden detener el desarrollo del hongo después de que éste ha penetrado en la planta y aun no presenta síntomas visibles.

Productos autorizados en Producción Integrada según su modo de acción:

- Acción preventiva: cobre, folpet, mancozeb, maneb, metiram.
- Fijación a las ceras cuticulares: ciazofamida, famoxadona, mandipropamid, vanifenalato, zoxamida
- Penetrantes: azoxistrobín, bentiavalicarb, cimoxanil, dimetomorf, piraclostrobín
- Sistémicos: benalaxil, benalaxil m, fosetil-al, iprovalicarb, metalaxil, metalaxil m.

Si observa una mancha de mildiu en viñedo, NO ARRANCAR la hoja de la cepa, y avisar a su cooperativa o a Sanidad Vegetal (tlf:677903144-671563556-677902801) y dptosv.dpco.capder@juntadeandalucia.es

OIDIO: (ceniza, gangrena, tizne) TRATAR. Mezclar el producto antiodio con los tratamientos del mildiu. Al ser esta una enfermedad endémica, todos los años ataca con más o menos intensidad.

Productos: AZOXISTROBIN ,BOSCALIDA + KRESOXIM METIL, CIPROCONAZOL, , FENBUCONAZOL, FLUQUINCONAZOL, FLUSILAZOL, KRESOXIM METIL, MEPTILDINOCAP, PIRACLOSTROBIM, METRAFENONA, MYCLOBUTANIL, PENCONAZOL, PROQUINAZID, QUINOXIFEN, SPIROXAMINA, TEBUCONAZOL, TETRACONAZOL, TRIADIMENOL, TRIFLOXISTROBIN consejo@montillamoriles.es

E. FENOLOGICOS: A=Yema invierno.....; C = Punta verde; D = Salida hojas; E = Hojas extendidas; F = Racimos visibles; G = Racimos separados; H = Botones florales separados; I₁ = Inicio floración; I₂ = Plena floración; J = Cuajado; ... O = Caída de hojas;