

ATRIA C.R.D.O.P. M-M

Consejo Regulador de la D. O. P. Montilla-Moriles

Aula de Viticultura

INFORMACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL VIÑEDO n° 9

ATRIA de VIÑA Campaña 2014			Para la semana 19 AL 24 de Mayo de 2014		
ENFERMEDADES	AVISO	PAGOS	PLAGAS	AVISO	PAGOS
<i>Mildiu</i>	Atentos a las lluvias /TRATAR		<i>Polilla racimo</i>	Observar glomérulos/NO TRATAR	
<i>Oidio</i>	TRATAR	TODOS	<i>Piral</i>		
<i>Podredumbres</i>			<i>Araña</i>		
<i>Yesca</i>			<i>Acariosis</i>		
<i>Excoriosis</i>			<i>Mosquito verde</i>		
<i>Eutypa</i>			<i>Erinosis</i>		
FENOLOGIA PX	De los días	12 al 18 de Mayo	Estado adelantado	J - K	Cuajado - Grano tamaño guisante
Estado predominante	I₂ J	Plena floración; Cuajado	Estado atrasado	I₂	Plena floración;

TRES RECOMENDACIONES:

MILDIU

Estar atentos a las previsiones meteorológicas para tratar el mildiu antes de que llueva. Hay presencia de contaminaciones primarias, aunque muy escasas pero diseminadas por todo el viñedo. Todos estos aviso de presencia de las primeras manchas se dieron dentro, del **Concurso MILDIU Premios FUNDACIÓN CAJA RURAL DE CORDOBA “Pedro Cabezuelo”**

Productos contra el mildiu ANTES de la lluvia: Sistémicos, penetrantes, fijación en ceras cuticulares, y sus mezclas con productos de contacto.

Productos contra el mildiu mas aconsejables DESPUÉS de la lluvia, características:

	Sistémicos	Penetrantes	Fijación a las ceras	Contacto
Acción de parada (Stop) (2)	fosetil-AI:2 días iprovalicarb:3 días benalaxil , benalaxil M, metalaxil y metalaxil M:4 días	2 días azoxistrobín, bentiavalicarb, cimoxanil, dimetomorf, piraclostrobín	NO (excepto ciazofamida que tiene 2 días)	NO
Acción erradicante (3) (desecamiento de manchas)	Iprovalicarb, - benalaxil , benalaxil M, metalaxil y metalaxil M:	NO	NO	NO

(2) pueden detener el desarrollo del hongo después de que éste ha penetrado en la planta.

(3) eliminación de los órganos contaminantes del hongo (**desecamiento de manchas**).

OIDIO

En las viñas de cabeza (en parcelas “limpias” de oidio), un buen azufrado en espolvoreo puede ser suficiente para el control de la enfermedad. Pero en parcelas infectadas o en plantaciones de espaldera es aconsejable, que con la pulverización contra el mildiu mezclarle alguno de los siguientes productos.

Productos: AZOXISTROBIN ,BOSCALIDA + KRESOXIM METIL, CIPROCONAZOL, DIFENOCONAZOL, FENBUCONAZOL, FLUQUINCONAZOL, FLUSILAZOL, KRESOXIM METIL, MEPTILDINOCAP, PIRACLOSTROBIM, METRAFENONA, MYCLOBUTANIL, PENCONAZOL, PROQUINAZID, PROPICONAZOL, QUINOXIFEN, SPIROXAMINA, TEBUCONAZOL, TETRACONAZOL, TRIADIMENOL, TRIFLOXISTROBIN

GUSANO DE LA UVA

POLILLA DEL RACIMO: (**gusano que pudre la uva**) **Lobesia**. Esta plaga se encuentra en el final de la 1ª generación. No tratar ahora pues hay una alta población de insectos auxiliares.

Se tiene previsto organizar charlas informativas para aclarar varios aspectos de la polilla y su control 2ª-3ª.

Para cualquier consulta al técnico del Aula de Viticultura, comunicarlo al correo consejo@montillamoriles.es .

E. FENOLOGICOS: A=Yema invierno; B=Inicio desborre; C = Punta verde; D = Salida hojas; E = Hojas extendidas; F = Racimos visibles; G = Racimos separados; H = Botones florales separados; I₁ = Inicio floración; I₂ = Plena floración; J = Cuajado; K = Grano tamaño guisante; L = Cerrado de racimos; M₁ = Inicio del envero; M₂ = Pleno envero; N = Maduración; O = Caída de hojas