

Chardonnay



Ampelografía

Sumidad:

Apertura extremidad Completamente abierto

Pelos postrados de la extremidad Pigmentación débil
Densidad débil

Pámpano:

Color entrenudo Verde con rayas rojas en la cara dorsal
Verde en la cara ventral

Color nudo Rojo en la cara dorsal
Verde con rayas rojas en la cara ventral

Densidad pelos tumbados Nula o muy baja en nudo
Nula o muy baja en entrenudo

Hoja joven:

Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales Nula o muy débil

Densidad pelos tumbados Baja entre nervios
Baja sobre nervios

Hoja adulta:

Tamaño del limbo Medio

Forma del limbo Pentagonal

Número de lóbulos Cinco

Disposición lóbulos del seno peciolar Medio abierto

Hinchazón del haz Medio

Perfil en sección transversal Plano

Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores Profundidad superficial con lóbulos abiertos



Pigmentación del haz Ausente o muy débil

Densidad pelos tumbados entre nervios principales Nula o muy baja


Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales Baja

Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo Peciolo más corto que el nervio principal con densidad nula o muy baja

Forma y longitud de dientes Dientes con ambos lados rectilíneos de longitud media y con relación longitud-anchura pequeña



Chardonnay



Racimo:

<i>Tamaño</i>	Pequeño
<i>Compacidad</i>	Medio-compacto
<i>Longitud pedúnculo</i>	Muy corto

Baya:

<i>Tamaño</i>	Muy pequeña
<i>Uniformidad tamaño</i>	Uniforme
<i>Color Epidermis</i>	Verde amarillo
<i>Forma del perfil</i>	Circular
<i>Separación pedicelo</i>	Difícil
<i>Grosor piel</i>	Gruesa
<i>Pigmentación pulpa</i>	Ausente o muy débil
<i>Consistencia pulpa</i>	Blanda
<i>Suculencia pulpa</i>	Muy jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Ninguno
<i>Formación pepitas</i>	Bien formada

Sarmiento:

<i>Color</i>	Amarillo-marrón amarillento
<i>Relieve superficie</i>	Lisa

Fenología:

Época de desborre: muy precoz-precoz

Época de maduración: muy temprana

Aptitudes agronómicas:

- Vigorosa, de brotación precoz. Se adapta a diversos tipos de terrenos y climas siempre que no sean húmedos. Muy resistente a clorosis, pero no a la sequía. Rendimiento bajo.
- Sensible al oídio y la flavescencia dorada.
- Sensible al millerandage y poco resistente a botrytis.

Potencial enológico:

- Vinos varietales o complementarios.
- Vinos potentes, afrutados, de acidez alta.
- Interesante la fermentación maloláctica y crianza en barricas.

